

GOGHEN F1



PLANTA

Pepino tipo “**slicer**”, partenocárpico con resistencia intermedia a **oidio (px)**.

Planta de un solo tallo, con entrenudo corto y precoz, con hábito de crecimiento abierto, con **pocos tallos laterales y hojas pequeñas**, favoreciendo la baja propagación de enfermedades y la **facilidad en la aplicación de tratamiento**, muy buena capacidad de cuaje con calor y muy poco problema de abortamientos de fruto. Dando un **muy alto rendimiento comercial** durante toda la producción.

FRUTO

Cilíndrico con forma muy uniforme de 20-22 cm de largo y de color **verde oscuro brillante sin mostrar la estrella amarilla pistilar** en la maduración, con espinas evidentes y excelente sabor. Muy buena **vida útil después de la cosecha** gracias a la firmeza de su carne que le da un **alto peso específico** y elevadísima conservación postcosecha.

Ciclo recomendado en cultivo protegido para producción en **primavera, verano y otoño**.

RESISTENCIAS:

HR: CCU

IR: PX/CVYV/CMV



CAMPO ALMERÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

■ Época de transplante-INVERNADERO

INMUNIDAD: no estar sujeto a ataques o infecciones por un parásito o patógeno específico.

RESISTENCIA: es la capacidad de una variedad de limitar el crecimiento y desarrollo de un parásito o patógeno específico y/o el daño que causa, en comparación con las variedades susceptibles colocadas en las mismas condiciones ambientales y de presión infecciosa del parásito o patógeno. Sin embargo, las variedades resistentes pueden mostrar algunas síntomas de enfermedad o daño en presencia de un ambiente altamente patógeno.

ALTA RESISTENCIA (HR): Se refiere a variedades vegetales capaces de limitar severamente el crecimiento y/o desarrollo de un parásito o patógeno específico y/o el daño causado por ellos, en condiciones normales de presión infecciosas, en comparación con variedades susceptibles. Sin embargo, estas variedades vegetales pueden manifestar algunas síntomas o daños en condiciones de alta presión por parásitos o patógenos. La alta resistencia no debe confundirse con Inmunidad o la capacidad de una variedad de no estar sujeta a ataques o infecciones por un parásito o patógeno específico.

RESISTENCIA INTERMEDIA (IR): se refiere a variedades vegetales capaces de limitar el crecimiento y/o desarrollo de ciertos parásitos o patógenos y/o el daño que causan, pero que pueden mostrar una gama más amplia de síntomas o daños, en comparación con variedades de alta resistencia (HR). Sin embargo, las variedades con resistencia intermedia mostrarán síntomas o daños menos pronunciados que las variedades susceptibles, si se cultivan en condiciones ambientales similares y/o con la misma presión infecciosa de parásitos o patógenos.

Esasem sigue las recomendaciones de la Federación Internacional de Semillas para la identificación de códigos de resistencia (ISF) y la Tabla de Armonización de Terminología de Resistencia (HRT) de Euroseeds y sus sucesoras actualizaciones.

Tras la revisión de las indicaciones del Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV) en tomate y pimiento, Euroseeds ha acordó que a partir del 10 de marzo de 2020 se identificará para todos la indicación de resistencia al TSWV:0 en tomates y pimientos como Resistencia Intermedia (IR). Tras este proceso de armonización, las empresas que anteriormente tenían indicado como HR, modificarán las indicaciones a IR de los productos afectados. Este ajuste tenía como objetivo aumentar la transparencia y coherencia de la comunicación sobre los indicios de resistencia no conduce a ningún cambio en la eficacia de la resistencia o en la genética de las variedades para las que se adaptarán las indicaciones.

Toda la información variada proporcionada oralmente o por escrito por Esasem o sus empleados, agentes o distribuidores, incluyendo toda la información contenida en los materiales informativos, sitios web y canales sociales, deben considerarse de buena fe, pero en ningún caso constituyen garantía de Esasem sobre el desempeño y sobre la idoneidad de las variedades vendidas. El rendimiento de una variedad puede verse influenciado por las condiciones climáticas, factores locales y otros factores externos. Esasem no asume ninguna responsabilidad por la información proporcionada. Para más aclaraciones contacte con el departamento técnico de Esasem.

Todas las épocas de trasplante sugeridas derivan de las experiencias de campo de los técnicos de Esasem y no constituyen una garantía sobre el comportamiento de las variedades para dichas épocas.

Para más información contacte a nuestro responsable de zona.

JUAN SILLERO Tel. 696 870 148 **JOSÉ RODA** Tel. 638 949 268